


GAMME ALEVINAGE : NEO SUPRA – NEO START



Aliments extrudés pour Alevins d'Esturgeon

- **Evolution progressive** du **profil en protéines et lipides** en fonction des besoins nutritionnels de chaque stade, rapport **PD / ED élevé**
- Forte proportion de **produits d'origine marine**
- **Aliments supplémentés** pour renforcer le système immunitaire des alevins : **MOS, B-Glucan, Vitamines et Minéraux**
- Utilisation **d'huiles essentielles** aux **propriétés anti bactériennes**, à but préventif, **pour limiter la pression sanitaire**

* Sans PAT: Protéines Animaux Terrestres

	NEO SUPRA				NEO START	
Ref. Commerciale	M00 / M0	M1 / M2	AL2 / AL3	AL4	1	2 / 3
Diamètre (mm)	<0,15 / 0,15-0,4	0,4-0,7 / 0,7-1	0,8 / 1,1	1,4	1,7	2,5 / 3,2
Présentation	Miette	Miette	Granulé	Granulé	Granulé	Granulé
Poids vifs	< 0,2	0,2 à 1,5 g	1,5 à 2,5 g	2,5 à 5 g	5 à 10 g	10 à 50 g

CONDITIONNEMENT

NEO SUPRA : sac de 20 kg ou seau de 10 kg
NEO START: sac de 25 Kg (20 Kg si semi-flottant)

Stocker l'aliment dans un endroit propre, frais et sec.

FLOTTAISON

NEO SUPRA : coulant (lentement)
NEO START : coulant ou semi-flottant

PROFIL NUTRITIONNEL INDICATIF

		NEO SUPRA	NEO START	
			1	2 / 3
Protéine	(%)	58	52	47
Lipides	(%)	13	17	18
Energie Digestible (ED)	(MJ/Kg)	19	19,2	19
PD / ED	(g/MJ)	29	25,5	23
Energie Brute	(MJ/Kg)	21,2	21,7	21,4
Cellulose	(%)	0,5	1	1,5
Cendre	(%)	9	9	8
Phosphore	(%)	1,5	1,5	1

VITAMINES INCORPORÉES

Vit. A (UI/Kg)	12 000	10 000
Vit. D3 (UI/Kg)	2 100	1 750
Vit. E (mg/Kg)	440	200
Vit. C (mg/Kg)	1 000	150

DURABILITÉ

Chez Le Gouessant nous pensons que l'aquaculture est durable si elle allie performance, qualité et préservation des ressources marines, c'est pourquoi nous sommes certifiés Global GAP.

TABLE DE RATIONNEMENT

Poids vif (g)			Aliment	P	L	Diamètre	Taux de rationnement (% de la biomasse/ jour) suivant les T°C																		
De		A					N°	(mm)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0,1	0,5	NEO SUPRA	58	13	M1	0,4-0,7	2,26	2,50	2,77	2,98	3,20	3,50	3,80	4,10	4,40	4,74	5,05	5,44	5,53	4,93	3,90	2,74	1,87		
0,5	1,5				M2 AL2	0,7-1	1,95	2,13	2,30	2,50	2,74	2,98	3,27	3,55	3,84	4,08	4,37	4,66	4,80	4,23	3,46	2,66	1,87		
1,5	2,5				AL3	1,2	1,74	1,90	2,05	2,20	2,42	2,62	2,87	3,13	3,40	3,58	3,82	4,00	4,10	3,68	3,10	2,50	1,87		
2,5	5				AL4	1,4	1,49	1,63	1,77	1,91	2,05	2,23	2,42	2,60	2,79	2,98	3,16	3,29	3,37	3,21	2,77	2,32	1,84		
5	10	NEO	52	17	1	1,7	1,26	1,35	1,46	1,56	1,65	1,74	1,84	1,95	2,05	2,15	2,24	2,30	2,38	2,38	2,32	2,10	1,77		
10	50	START	47	18	2	2,5	1,16	1,25	1,35	1,45	1,54	1,64	1,74	1,84	1,93	2,02	2,10	2,15	2,20	2,20	2,16	1,98	1,72		

Les taux de nourrissages sont indicatifs et basés sur la valeur nutritionnelle des aliments. Ils doivent être adaptés aux conditions locales et aux objectifs de l'élevage.